





Class Q L 466

Book A 88









ATLAS

DES

INSECTES.

Note des différens Atlas d'Histoire naturelle qui se vendent séparément chez le même Libraire.

ATLAS POUR LA BOTANIQUE, composé de 120 P	lanches.
Figures noires	. 18 fr.
Figures coloriées	. 36 fr.
ATLAS POUR LES COQUILLES, 44 Planches,	Figures
noires	of fr.
Figures coloriées	7/4 fr
ATLAS POUR LES CRUSTACÉES, 18 Planches,	Figures
noires	
Figures coloriées	6 fr
ATLAS POUR LES INSECTES, 110 Planches,	Figure
MILAS FOUR LES INSECTES, 110 I lanches,	Ligures fr
noires	. 17 11.
Figures coloriées	. 54 II.
ATLAS POUR LES MANNIFÈRES, 80 Planches,	
noires	
Figures coloriées	
ATLAS POUR LES MINÉRAUX, 40 Planches,	
noires	. 6 fr.
Figures coloriées	. 12 fr.
ATLAS POUR LES OISEAUX, 129 Planches,	
noires	. 20 fr.
Figures coloriées	. 40 fr.
ATLAS POUR LES Poissons, 155 Planches,	Figures
noires	. 24 fr.
Figures coloriées	
ATLAS POUR LES REPTILES, 54 Planches,	Figures
noires	
Figures coloriées	. 18 fr.
ATLAS POUR LES VERS, 32 Planches, Fig. noire	
Figures coloriées	

ATLAS

DES

INSECTES,

COMPOSÉ DE 110 PLANCHES,

REPRÉSENTANT

LA PLUPART DES INSECTES DÉCRITS

DANS LE

MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE

ET DANS

LE MANUEL D'ENTOMOLOGIE.



PARIS,

RORET, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE,

QL466 A88



Q 1, 466 . 949

TABLE MÉTHODIQUE

(D'APRÈS OLIVIER)

DES PLANCHES DE L'HISTOIRE DES INSECTES

DU

MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE.

Nota. Les numéros renvoient aux pages du Manuel. — La table alphabétique renvoie aux deux volumes du Manuel d'Entomologie.

Anatomie des insectes, pl. 1, p. 368.

- pl. 2, p. 368.
- pl. 3, p. 368.
- pl. 4, p. 368.

Ier Ordre. Des Lépidoptères.

G. papillon: les chevaliers, p. 480.

Papillon Priam, pl. 5, fig. 1, p. 480.

- leytus, pl. 5, fig. 2, p. 480. - du fenouil, pl. 6, fig. 1, p. 480.
- du ricin, pl. 6, fig. 2, p. 480.
- Apollon, pl. 6, fig. 3, p. 480.
- Idem (sa chenille), pl. 6, fig. 4, p. 480.

Les Danaïdes.

- aurore, male, pl. 7, fig. 1, p. 480.
- aurore, femelle, pl. 7, fig. 1, p. 480.
- souci, pl. 7, fig. 2, p. 480.
- de la casse, pl. 7, fig. 3, p. 480.
- Tristan, pl. 8, fig. 1, p. 480.
- mars, pl. 8, fig. 2, p. 480.

Les Nymphales, 480.

- Paon de jour, pl. 9, fig. 1, p. 480.
- de la cassave, pl. 9, fig. 2, p. 480.
- Morio, pl. 9, fig. 3, p. 480.

Papillon hypsile, pl. 10, fig. 1, p. 480.

- deuil, pl. 10, fig. 2, p. 480.

- Sa chenille, pl. 10, fig. 2, p. 480. - petit nacré, pl. 10, fig. 3, p. 480.

Les Phlébéiens.

- Cupidon, pl. 11, fig. 1, p. 480. - vergeté, pl. 11, fig. 2, p. 480.

- porte-queue bleu strié, pl. 12, fig. 1, p. 480.

- miroir, pl. 12, fig. 2, p. 480.

Sphinx tête-de-mort, pl. 13, fig. 1; (sa chenille), fig. 2, p. 481.

- du troëne, pl. 13, fig. 3, p. 481.

- de la vigne, pl. 14, fig. 1; (chenille), fig. 2, (chrysalide), fig. 3, p. 481.

- Sa chenille, pl. 15, fig. 2.

Sésie moro-sphinx, pl. 15, fig. 1; (sa chenille), fig. 2, p. 482.

- apiforme, pl. 16, fig. 1, p. 482.

- de la filipendule, pl. 16, fig. 2; (sa chenille), fig. 3; (sa coque), fig. 4, p. 482.

-turquoise, pl. 16, fig. 5, p. 482.

Bombyce atlas, pl. 17, p. 482.

- grand paon, pl. 18, fig. 1; (sa chenille), fig. 2. (sa coque), fig. 3; (sa chrysalide), fig. 4, p. 482. - de chêne, pl. 19, fig. 1; (sa chenille), fig. 2,

p. 482. - queue fourchue, pl. 19, fig. 3; (sa chenille),

fig. 4, p. 482.

- processionnaire, pl. 20, fig. 1, p. 482.

- chrysorrhée, pl. 20, fig. 2; (sa chenille),

fig. 3, p. 482.

- ver à soie, pl. 21, fig. 1; (sa chenille), fig. 2; (sa coque), fig. 3; (sa chrysalide), fig. 4; (ses œufs), fig. 5, p. 482.

- cossus, pl. 22, fig. 1; (sa chenille), fig. 2; (sa coque), fig. 3; (sa chrysalide), fig. 4, p. 482.

- disparate (male), pl. 23, fig. 1; (femelle), fig. 2; (ses œufs), fig. 3; (sa chenille), fig. 4, p. 482. — carmin, pl. 24, fig. 1; (chenille), fig. 2, p. 482.

- étoilé, pl. 24 (mâle), fig. 3; (femelle), fig. 4;

(chenille), fig. 5; (coque), fig. 6, p. 482.

Hépiale louvette, pl. 25, fig. 5, p. 483.

Noctuelle hiéroglyphique, pl. 25, fig. 1, p. 484.

- pâle, pl. 25, fig. 2, p. 484.

- à quatre points (mâle), pl. 25, fig. 3; (femelle), fig. 4, p. 484.

- batis, pl. 26, fig. 1; (chenille), fig. 2; (chry-

salide), fig. 3, p. 484.

- du frêne, pl. 26, fig. 4, p. 484.

- du chêne, pl. 27, fig. 1; (chrysalide), fig. 3;

(chenille), fig. 2, p. 484. — découpée, pl. 28, fig. 1; (chenille), fig. 2; (chrysalide), fig. 3, p. 484.

- ansée, pl. 29, fig. 1, p. 484.

- sulfurée, pl. 29, fig. 2, p. 484. - vert-dorée, pl. 29, fig. 3, p. 484. - de la festuque, pl. 29, fig. 4, p. 484.

- du bouillon blanc, pl. 30, fig. 1; (chenille), fig. 2; (coque), fig. 3; (chrysalide), fig. 4, p. 484. Phalène printannière, pl. 31, fig. 1, p. 483.

- en faucille, pl. 31, fig. 2, p. 483. - soufrée, pl. 31, fig. 3, p. 483.

- jaspée, pl. 31, fig. 4, p. 483.

- verte, pl. 32, fig. 1; (chenille), fig. 2; (chrysalide), fig. 3, p. 483.

- du stratiote, pl. 32, fig. 4, p. 483. - mouchetée, pl. 32, fig. 5, p. 483.

- à bande à l'envers, pl. 32, fig. 6, p. 483. Pyrale verte à bandes, pl. 33, fig. 1; (chenille), fig. 2; (coque), fig. 3, p. 484.

- des pommes, pl. 33, fig. 4; (chenille), fig. 5;

(chrysalide), fig. 6, p. 484.

Teigne de la cire, pl. 34, fig. 1; (chenille), fig. 2; (coque), fig. 3; (chrysalide), fig. 4, p. 485.

- fripière, pl. 35, fig. 1; (chenille), fig. 2; (chry-

salide), fig. 3, p. 485.

- des pelleteries, pl. 35, fig. 4; (chenille), fig. 5; (fourreau), fig. 6; (chrysalide), fig. 7, p. 485.

- du fusain, pl. 36, fig. 1; (coques), fig. 2, p. 485. - des tapisseries, pl. 36, fig. 3; (chenille), fig. 4; (fourreau), fig. 5; (chrysalide), fig. 6, p. 485. Alucite des grains, pl. 37, fig. 1; (chenille), fig. 2, p. 485; (paquets de grains), fig. 3; (chrysalide), fig. 4, p. 485.

Alucite de Degéer, pl. 37, fig. 5, p. 485. — de Réaumur, pl. 38, fig. 1, p. 485.

- d'Erxleben, pl. 38, fig. 2, p. 485. Ptérophore en éventail, pl. 38, fig. 3, p. 486.

- pentadactyle, pl. 38, fig. 4, p. 486. - tesseredactyle, pl. 38, fig. 5, p. 486.

II. Ordre. Les Névroptères.

Libellule bronzée, pl. 39, fig. 1, p. 446.

- grande, pl. 39, fig. 2, p. 446. - vierge, pl. 39, fig. 3, p. 446.

- Amelie, pl. 40, fig. 1; (mâle), fig. 2; (femelle), p. 446.

Perle brune, pl. 40, fig. 3, p 453.

Rafidie ophiopse, pl. 41, fig. 1, p. 453.

Hémérobe aquatique, pl. 41, fig. 2; (larve), fig. 3; (nymphe), fig. 4, p. 462.

- perle, pl. 41, fig. 5, p. 462.

chrysops, pl. 42, fig. 1, p. 462.
Myrmiléon des fourmis, pl. 42, fig. 2; (larve), fig. 2; (coque), fig. 4; (peau de la nymphe), fig. 5; (tête de la larve), fig. 6, p. 465.

- libelluloïde, pl. 43, fig. 1, p. 465.

— ascalaphe barbare, pl. 43, fig. 2, p. 465. Panope commune, pl. 43, fig. 3, p. 451.

Frigane strice, pl. 43, fig. 4; (larve), fig. 5, p. 453.

— grande, pl. 44, fig. 1; (larve), fig. 2, p. 453.

— rhombifere, pl. 44, fig. 3; (fourreau), fig. 4,

- rhombitère, pl. 44, fig. 3; (fourreau), fig. 4 p. 453. Enhandre commune, vl. 44, fig. 5; (tâte d'éphé

Ephémère commune, pl. 44, fig. 5; (tête d'éphémère), fig. 6, p. 446; (termès fatale), pl. 45, fig. 4; (nymphe), fig. 5, p. 453.

III Ordre. Les Hyménoprères.

Fourmi-hercule, pl. 45, fig. 1, p. 465.

— fauve, pl. 45, fig. 2; (coque), fig. 3, p. 465.

Mutille européen, pl. 46, fig. 1, p. 466.

Frelon criblé, pl. 46, fig. 2, p. 465.

Guêpe-frelon, pl. 46 (mâle), fig. 3; (femelle), fig. 4, p. 471.

9 Guêpe commune, pl. 46, fig. 5, p. 471. Guépier de la guêpe cartonnière, pl. 47, fig. 1; (leucopsis dorsigère), fig. 2; (chrysis), fig. 3, p. 471. Typhie à grosses cuisses, pl. 48, fig. 1, p. 303 et 347.Evanie appendigastre, pl. 48, fig. 2. Ichneumon attrayant, pl. 48, fig. 3, p. 459. - jaunâtre, pl. 48, fig. 4, p. 459. - pelotonné, pl. 48, fig. 5, p. 459. Urocère géant, pl. 49, fig. 1, p. 456. Cimbex fémoral, pl. 49, fig. 2 et 3, p. 456. - jaune, pl. 50, fig. 1; (sa larve), fig. 2; (sa coque), fig. 3; (anneaux de la larve), fig. 4, p. 456. -- du saule, pl. 51, fig. 1 et 2; (larve), fig. 3; (coque), fig. 4; (nymphe), fig. 5, (dépouilles de la larve), fig. 6; (œufs), fig. 7, p. 456. Tenthredo sans nœuds, pl. 52, fig. 1, p. 456. - du pin, pl. 52, fig. 2, p. 456. - septentrional, pl. 52, fig. 3, p. 456. - à tête jaune, pl. 52, fig. 4, p. 456. Galles de chêne, pl. 53, fig. 1 et 2; (larve), fig. 3, p. 441. Diplolèpe, pl. 53, fig. 4, p. 455 et 441. - du rosier, pl. 52, fig. 5, p. 455 et 470. Cinyps des chrysalides, pl. 53, fig. 5, p. 441. Chalcis clavipède, pl. 53, fig. 6, p. 4617 Sphex du sable, pl. 54, fig. 1, p. 468. - azuré, pl. 54, fig. 2, p. 468. - porte-épine, pl. 54, fig. 3, p. 468. Scolie à quatre taches, pl. 54, fig. 4, p. 467. - des jardins, pl. 54, fig. 5, p. 467. Bembex de la Caroline, pl. 55, fig. 1, p. 468. - pubescent, pl. 55, fig. 2, p. 468.

Andrène du coquelicot, pl. 55, fig. 3, p. 472 - verte, pl. 55, fig. 4, p. 472. - verdâtre, pl. 55, fig. 5, p. 472. Abeille (ruche en livre), pl. 56, p. 477. - terrestre, pl. 57, fig. 1, p. 477.

- à miel, pl. 57, fig. 2, p. 477. Eucère à longues antennes, pl. 57, fig. 3, p. 476 Nomade à antennes rousses, pl. 57, fig. 4, p. 474.

IV. Ordre, Les Hémiptères.

Fulgore porte-lanterne, pl. 57, fig. 5, p. 442. - porte-chandelle, pl. 58, fig. 1, p. 442. - phalénoïde, pl. 58, fig. 2, p. 442. Membracis cornue, pl. 58, fig. 3, p. 442. - aureillarde, pl. 58, fig. 4, p. 442. Cigale ornée, pl. 58, fig. 5, p. 441. Tettigonie à taches rouges, pl. 59, fig. 1. - à écumes, pl. 59, fig. 2, p. 442. Psylle du figuier, pl. 59, fig. 3, p. 443. Puceron de l'orme, pl. 59, fig. 4, p. 443. Thrips de l'orme, pl. 59, fig. 4. p. 443. Kermes femelle du petit chêne, pl. 59, fig. 6, p. 444. Cochenille de l'oranger, pl. 69, fig. 1, p. 444. Aleyrode de l'éclaire, pl. 60, fig. 2 et 2, p. 443. Notonecte glauque, pl. 60, fig. 3, p. 441. Corise striée, pl. 60, fig. 4, p. 441. Nèpe linéaire, pl. 60, fig. 5, p. 440. - cendrée, pl. 60, fig. 6, p. 440. - cimicoïde, pl. 61, fig. 1, p. 440. Punaise feuille épineuse, pl. 61, fig. 2, p. 438. - rongée, pl. 61, fig. 3, p. 438. - porte-croix, pl. 61, fig. 4, p. 438. - aptère, pl. 61, fig. 5, p. 435. Pentatome de Fabricius, pl. 61, fig. 6, p. 437. - à lignes noires, pl. 61, fig. 7, p. 437. - des buissons, pl. 61, fig. 8, p. 437. - des légumes, pl. 62, fig. 1, p. 437. - orné, pl. 62, fig. 2, p. 437. Reduve à masque, pl. 62, fig. 3, p. 439.

Ve Ordre. Les ORTHOPTÈRES.

Blatte de Madère, pl. 62, fig. 4, p. 434. - kakerlac, pl. 62, fig. 5, p. 434. Grillon-taupe, pl. 63, fig. 1; (patte antérieure), fig. 2; (nid), fig. 3, p. 435. - champêtre, pl. 63, fig. 4 et 5 (mâle et femelle), p. 435. Sauterelle rouge à verrues, pl. 64, fig. 1 et 2 (mâle et femelle); (larve), fig. 3; (œufs), fig. 4, p. 435. Mante oratorienne, pl. 65, fig. 1, p. 434. Truxale à grand nez, pl. 65, fig. 2, p. 436. Criquet morbilleux, pl. 65, fig. 3, p. 436. — hiponetué, pl. 65, fig. 4, p. 436.

VIº Ordre. Les Coléoptères.

Lucane cerf-volant, pl. 66, fig. 1 (mâle); fig. 2 (femelle), p. 410. Passale interrompu, pl. 66, fig. 33, p. 410. Letrus céphalote, pl. 66, fig. 4, p. 407. Cynodendron cylindrique, pl. 67, fig. 1, p. 410. Scarabée-Hercule, pl. 67, fig. 2, p. 408. - fimetaire, pl. 67, fig. 3, p. 408. - hourreau, pl. 67 (mâle et femelle), fig. 4 et 5, p. 408. - sacré, pl. 68, fig. 1, p. 408. Trox sabuleux, pl. 68, fig. 2, p. 408. Hanneton foulon, pl. 68, fig. 3, p. 409. Cétoine marginée, pl. 68, fig. 4, p. 409. Trichie delta, pl. 68, fig. 5, p. 408. Hexodon réticulé, pl. 69, fig. 1, p. 408. Escarbot réniforme, pl. 69, fig. 2, p. 399 et 400. Dermeste du lard, pl. 69, fig. 3, p. 399, 402. Tétratome des bolets, pl. 69, fig. 4, p. 415. Nécrophore fossoyeur, pl.69, fig. 5; (larve), fig. 6, p. 401. Bouclier thoracique, pl. 70, fig. 1, p. 399 et 401. Nitidule bordée, pl. 70, fig. 2, p. 402. Byrrhe pilule, pl. 70, fig. 3, p. 399, 402. Anthrène destructeur, pl. 70, fig. 4, p. 472. Spheridie scaraboïde, pl. 70, fig. 5, p. 405 et 406. Vrillette marquetée, pl. 70, fig. 6, p. 397. Ptine impérial, pl. 71, fig. 1, p. 397.

— pectinicorne, pl. 71, fig. 2, p. 397. Ips a antennes noires, pl. 71, fig. 3, p. 397. Lyctes canaliculé, pl. 71, fig. 4, p. 424. Micétophage quadrimaculé, pl. 71, fig. 5, p. 424. Hypophles marron, pl. 71, fig. 6, p. 414. Trogosite verdâtre, pl. 71, fig. 7, p. 424. Scaphidie quadrimaculé, pl. 72, fig. 1, p. 422.

Mélyre vert, pl. 72, fig. 2, p. 396.

Tille serraticorne, pl. 72, fig. 3, p. 400. Drile jaunatre, pl. 72, fig. 4, p. 396. Omalise sutural, pl. 72, fig. 5, p. 395. Lymexilon naval, pl. 72, fig. 6, p. 392-398. Téléphore bimaculé, pl. 72, fig. 7, p. 395. Malachie bronzé, pl. 73, fig. 1, p. 395. Lampyre marginé, pl. 73, fig. 2, p. 395. Lycus réticulé, pl. 73, fig. 3, p. 395. Mélasis buprestoïde, pl. 73, fig. 4, p. 393. Cébrion longicorne, pl. 73, fig. 5, p. 392. Taupin tricolor, pl. 73, fig. 6, p. 392. - phosphorique, pl. 74, fig. 1, p. 392. Bupreste bande-dorée, pl. 74, fig. 2, p. 393. - marron, pl. 74, fig. 3, p. 393. - interrompu, pl. 75, fig. 1, p. 393. - rubis, pl. 75, fig. 2, p. 393. Cicindèle carolinoise, pl. 75, fig. 3, p. 381. Elaphre aquatique, pl. 75, fig. 4, p. 386. Carabe américain, pl. 75, fig. 5, p. 385. - bimaculé, pl. 76, fig. 1, p. 385. - ceint, pl. 76, fig. 2, p. 385. Scarite geant, pl. 76, fig. 3, p. 383. Manticore maxillaire, pl. 76, fig. 4, p. 380. Elophore aquatique, pl. 76, fig. 5, p. 406. Hydrophile brun, pl. 77, fig. 405. Dytique marginal (mâle), pl. 77, fig. 2, (femelle), p. 405. Gyrin nageur, pl. 78, fig. 1, p. 387 et 388. Dryops auriculé, pl. 78, fig. 2, p. 400 et 404. Staphylin hourdon, pl. 78, fig. 3, p. 389. Oxypore maxillaire, pl. 78, fig. 4, p. 389. Pédère riverain, pl. 78, fig. 5, p. 390. Cantharide vésicante, pl. 79, fig. 1, p. 419. Meloë de mai, pl. 78, fig. 6, p. 419. Mylabre trifascié, pl. 79, fig. 2, p. 419. Zonite piézate, pl. 79, fig. 3, p. 419.

Zonite piézate, pl. 79, fig. 3, p. 419. Cérocome de Schæffer, pl. 79, fig. 4, p. 419. Lagrie velue, pl. 79, fig. 5, p. 416. Ademère bleue, pl. 79, fig. 6, p. 470. Notoxe unicorne, pl. 79, fig. 7, p. 418. Apale bimaculé, pl. 80, fig. 1, p. 417. Pyrochre cardinal, pl. 80, fig. 2, p. 417. Horie maculée, pl. 80, fig. 3, p. 418. Cistèle ceramboïde, pl. 80, fig. 4, p. 416. - sulphureuse, pl. 80, fig. 5, p. 416. Diapère du Bolet, pl. 80, fig. 6, p. 414. Opatre gris, pl. 81, fig. 1, p. 413. Tenebrion culinaire, pl. 81, fig. 2, p. 414. Serropalpe caraboide, pl. 81, fig 3, p. 415. Helops lanipède, pl. 81, fig. 4, p. 416. Pimélie striée, pl. 81, fig. 5, p. 412. Blaps lisse, pl. 82, fig. 1, p. 413. Sepidie réticulée, pl. 82, fig. 2, p. 412. Scaure strié, pl. 82, fig. 3, p. 412. Crocise bossu, pl. 82, fig. 4, p. 474. Mordelle 8 points, pl. 82, fig. 5. Ripiphore flabelle, pl. 82, fig. 6. Prione cervicorne, pl. 83, p. 425. Capricorne rosalie, pl. 84, fig. 1, p. 426. - sutural, pl. 85, p. 426. - quadrimaculé, pl. 84, fig. 2, p. 426. Saperde ponctué, pl. 84, fig. 3, p. 426. - bicolore, pl. 87, fig. 2, p. 426. Lamie trifasciée, pl. 86, fig. 1, p. 426. - triste, pl. 86, fig. 2, p. 426. - tornator, pl. 87, fig. 3, p. 426. Stencore azuré, pl. 87, fig. 3, p. 426. Callidie stigmate, pl. 87, fig. 4, p. 426. - usé, pl. 87, fig. 5, p. 426. - du verbascum, pl. 88, fig. 1, p. 426. Lepture hastée, pl. 88, fig. 2, p. 426. - quadrimaculée, pl. 88, fig. 3, p. 426. - interrogation, pl. 88, fig. 4, p. 426. Donacie rayée, pl. 88, fig. 5, p. 427. Necydale fauve, pl. 88, fig. 6, p. 426. Molorque racourci, pl. 89, fig. 1, p. 426. Calope serraticorne, pl. 89, fig. 2, p. 416. Lupère flavipède, pl. 89, fig. 3, p. 429. Spondyle buprestoide, pl. 89, fig. 4, p. 425. Clairon ichneumonaire, pl. 90, fig. 2, p. 399. - mutillaire, pl. 89, fig. 5, p. 399 et 400. Bostriche capucin, pl. 90, fig. 1, p. 484.

Scolyte bostriche, pl. 90, fig. 3, p. 423. Bruche du bois, pl. 90, fig. 4, p. 421. Anthribe marbré, pl. 90, fig. 5, p. 421. Attelabe tête écorchée, pl. 90, fig. 6, p. 421. - vert, pl. 90, fig. 7, p. 421. Brachycère algérien, pl. 90, fig. 8, p. 422. Charancon palmiste, pl. 91, fig. 1, p. 422. - paraplectique, pl. 91, fig. 2, p. 422 - du sapin, pl. 91, fig. 3, p. 422. - des noisettes, pl. 91, fig. 4, p. 422. - impérial, pl. 91, fig. 5, p. 422. - de Rhor, pl. 91, fig. 6, p. 422. Brente linéaire, pl. 92, fig. 1, p. 422. Rhinomacer charangon, pl. 92, fig. 2, p. 417. Macrocéphale albinos, pl. 92, fig. 3, p. 476. Collidie allongé, pl. 92, fig. 4, p. 424. Cucujo clavipede, pl. 92, fig. 5, p. 424. Erotyle géant, pl. 92, fig. 6, p. 430. - surinamois, pl. 93, fig. 1, p. 430. Alurne tricolor, pl. 93, fig. 2, p. 430. - grosses cuisses, pl. 93, fig. 3, p. 430. Chrysomèle rayée, pl. 93, fig. 4, p. 429. - pustulée, pl. 93, fig. 5, p. 429. - à collier, pl. 94, fig. 1, p. 429. - bordée, pl. 94, fig. 2, p. 429. Eudomique écarlate, pl. 94, fig. 3, p. 429. Altise caroline, pl. 94, fig. 4, p. 430. - bicolore, pl. 94, fig. 5, p. 430. Galéruque rustique, pl. 94, fig. 6, p. 430. - violette, pl. 94, fig. 7, p. 430. Criocère bimaculé, pl. 95, fig. 1, p. 427. — anguleux, pl. 95, fig. 2, p. 427. Hispe testacée, pl. 95, fig. 3, p. 428. - âtre, pl. 95, fig. 4, p. 428. Gribouri azuré, pl. 95, fig. 5, p. 428. - bleuet, pl. 96, fig. 6, p. 428. - cordifère, pl. 96, fig. 1, p. 438. - huit taches pl. 96, fig. 2, p. 428. - de la vigne, pl. 96, fig. 3, p. 428. Clytre longimane, pl. 96, fig. 5, p. 428. - longipède, pl. 96, fig. 5, p. 428.

Clytre bucéphale, pl. 96, fig. 6, p. 428.

— rougeâtre, pl. 97, fig. 1, p. 428.

Casside verte, pl. 97, fig. 2, p. 428.

— maculée, pl. 97, fig. 3, p. 428.

— grosse, pl. 97, fig. 4, p. 428.

— treillie, pl. 97, fig. 5, p. 428.

Tritome bipustulé, pl. 98, fig. 1, p. 430.

Coccinelle imponetuée, pl. 98, fig. 2, p. 431.

— oculée, pl. 98, fig. 3, p. 431.

— échiquier, pl. 98, fig. 4, p. 431.

Forficule biponetué, pl. 98, fig. 5, p. 434.

VIIe Ordre. Les DIPTÈRES.

OEstre des veaux, pl. 99, fig. 1, p. 467.
Taon albipède, pl. 99, fig. 2, p. 492.

— ruficorne, pl. 99, fig. 3, p. 492.

— noir, pl. 99, fig. 4, p. 492.

Nemotèle hottentote, pl. 100, fig. 1, p. 494.

Stratiome caméléon; pl. 100, fig. 2; (la larve), fig. 3, p. 494.

— triliné, pl. 100, fig. 4, p. 494.

— clavipède, pl. 100, fig. 5, p. 494.

Syrphe vive, pl. 101, fig. 1, p. 496.

— bourdon, pl. 101, fig. 2, p. 496.

- pendant, pl. 101, fig. 3, p. 496. - tenace, pl. 101, fig. 4, p. 496. - clavipède, pl. 101, fig. 5, p. 496. - crieur, pl. 101, fig. 6, p. 496.

Mouche meridienne, pl. 102, fig. 1, p. 497.

- géante, pl. 102, fig. 2, p. 497.
- arrondie, pl. 102, fig. 3, p. 497.
- solstitiale, pl. 102, fig. 4, p. 497.
- cuivrane, pl. 102, fig. 5, p. 497.
Stomoxe sibérite, pl. 103, fig. 1, p. 495.
Rhingie à bec, pl. 103, fig. 2, p. 495.
Conopsrufipède, pl. 103, fig. 3, p. 495.
Myope ferrugineux, pl. 103, fig. 4, p. 495.
Rhagion bécasse, pl. 103, fig. 5, p. 426.
Asile frelon, pl. 103, fig. 6, p. 491.

- doré, pl. 104, fig. 1, p. 491. - bordé, pl. 104, fig. 2, p. 491. Asile teuton, pl. 104, fig. 3, p. 491.
Empis appendiculée, pl. 104, fig. 4, p. 491.
Bombille bichon, pl. 104, fig. 5, p. 492.
— ponctué, pl. 105, fig. 1, p. 492.
Cousin commun, pl. 105, fig. 2, p. 489.
Tipule pectinicorne, pl. 105, fig. 3, p. 489.
Bibion précoce, pl. 105, fig. 4, p. 490.
— noir, pl. 105, fig. 5 et 6 (mâle et femelle), p. 490.

Hippobosque du cheval, pl. 106, fig. 1, p. 499.
— de l'hirondelle, pl. 106, fig. 2, p. 499.

VIII. Ordre. Les Aptères.

Puce irritante, pl. 106, fig. 3; (larve), fig. 4, p. 377.

Lépismene du sucre, pl. 106, fig. 5, p. 375.

Podure verte, pl. 107, fig. 1, p. 376.

Pou humain, pl. 107, fig. 2, p. 377.

— du pubis, pl. 107, fig. 3, p. 377.

— de la cigogne, pl. 107, fig. 4, p. 377.

Trombidion des teinturiers, pl. 107, fig. 5, p. 365.

Mitte reduve, pl. 107, fig. 6, p. 363.

Araignée porte-croix, pl. 108, fig. 1, p. 355.

— aviculaire, pl. 108, fig. 2; (portion de sa tête), fig. 3; (autre portion), fig. 4; (nid), fig. 5, p. 355.

Scorpion d'Europe, pl. 109, fig. 1, p. 362. Faucheur des murailles, pl. 109, fig. 2, p. 364. Cloporte aselle, pl. 109, fig. 3, p. 349. — océanique, pl. 109, fig. 4, p. 349. Iule terrestre, pl. 110, fig. 1, p. 366. Scolopendre mordante, pl. 110, fig. 2, p. 375.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PLANCHES

DE L'HISTOIRE DES INSECTES

DU

MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE

ET DU

MANUEL D'ENTOMOLOGIE.

Nota. Les chiffres romains indiquent les tomes, et les chiffres arabes les pages du Manuel d'Entomologie.

A

Abeille (ruche en livre), pl. 56, p. 477. II, 287. — à miel, pl. 57, fig. 2, p. 477. - terrestre, pl. 57, fig. 1, p. 477. Ademère bleue, pl. 79, fig. 6, p. 470. Aleyrode de l'éclaire, pl. 60, fig. 2 et 2, p. 443. II. 168. Altise bicolore, pl. 94, fig. 5, p. 430. II, 63. - caroline, pl. 94, fig. 4, p. 430. Alucite de Degéer, pl. 37, fig. 5, p. 485. II, 349. — d'Erxleben, pl. 38, fig. 2, p. 485. -des grains, pl. 37, fig. 1; (chenille), fig. 2, p. 485; (paquet de grains), fig. 3; (chrysalide), fig. 4; p. 485. - de Réaumur, pl. 38, fig. 1, p. 485. Alurne grosses cuisses, pl. 93, fig. 3, p. 430. II, 46. - tricolore, pl. 93, fig. 2, p. 430. Anatomie des insectes, pl. 1, p. 368. I, 13. - des insectes, pl. 2, p. 368. I, 13.

Anatomie des insectes, pl. 3, p. 368. I, 13.

— des insectes, pl. 4, p. 368. I, 13.

Anthrène du coquelicot, pl. 55, fig. 3, p. 472. I, 298.

Anthrène verte, pl. 55, fig. 4, p. 472.

Anthrène verdâtre, pl. 55, fig. 5, p. 472.

Anthrène destructeur, pl. 70, fig. 4, p. 472.

Apale bimaculé, pl. 80, fig. 1, p. 417. I, 381.

Anthribe marbré, pl. 90, fig. 5, p. 421. I, 398.

Araignée aviculaire, pl. 108, fig. 2; (portion de sa tête), fig. 3; (autre portion), fig. 4; (nid), fig. 5, p. 355.

— porte-croix, pl. 108, fig. 1, p. 355. Attelabe vert, pl. 90, fig. 7, p. 421. I, 402. — tête écorchée, pl. 90, fig. 6, p. 421.

B.

Bembex de la Caroline, pl. 55, fig. 1, p. 468. II, 252.

— pubescent, pl. 55, fig. 2, p. 468.
Bibion noir, pl. 105, fig. 6 (m. et fem.), p. 490.

II, 363.

— précoce, pl. 105, fig. 4, p. 490.
Blaps lisse, pl. 82, fig. 1, p. 413. I, 352.
Blatte kakerlac, pl. 62, fig. 5, p. 434. II, 92.

— de Madère, pl. 62, fig. 4, p. 434. Bombile bichon, pl. 104, fig. 5, p. 492. II, 325.

— ponctué, pl. 105, fig. 1, p. 492.

Bombyce atlas, pl. 17, p. 482. II, 327.

— de chêne, pl. 19, fig. 1; (sa chenille), fig. 2, p. 482.

- carmin, pl. 24, fig. 1; (chenille), fig. 2, p. 482. - chrysorrhée, pl. 20, fig. 2; (sa chenille), fig. 3,

p. 482.

- cossus, pl. 22, fig. 1; (sa chenille), fig. 2; (sa coque), fig. 3; (sa chrysalide), fig. 4, p. 482.
- disparate (måle), pl. 23, fig. 1; (fem.), fig. 2;

(ses œufs), fig. 3; (sa chenille), fig. 4, p. 482. — étoilé, pl. 24; (mâle), fig. 3; (femelle), fig. 4; (chenille), fig. 5; (coque), fig. 6, p. 482.

- grand paon, pl. 18, fig. 1; (sa chenille), fig. 2; (sa coque), fig. 3; (sa chrysalide), fig. 4, p. 482.

Bombyce processionnaire, pl. 20, fig. 1, p. 482.
— queue fourchue, pl. 19, fig. 3; (sa chenille),

fig. 4, p. 482.

- ver à soie, pl. 21, fig. 1; (sa chenille), fig. 2; (sa coque), fig. 3; (sa chrysalide), fig. 4; (ses œufs), fig. 5, p. 482.

Bostriche capucin, pl. 90, fig. 1, p. 484. II, 7. Bouclier thoracique, pl. 70, fig. 1, p. 399 et 401.

I, 287.

Brachycère algérien, pl. 90, fig. 8, p. 422. I, 432. Brente linéaire, pl. 92, fig. 1, p. 422. I, 433. Bruche du bois, pl. 90, fig. 4, p. 421. I, 399. Bupreste bande dorée, pl. 74, fig. 2, p. 393. I, 241.

- interrompu, pl. 75, fig. 1, p. 393.

- marron, pl. 74, fig. 3, p. 393. - rubis, pl. 75, fig. 2, p. 393.

Byrrhe pilule, pl. 70, fig. 3, p. 399 et 402. I, 300.

C.

Callidie stigmate, pl. 87, fig. 4, p. 426. II, 26.

- usée, pl. 87, fig. 5, p. 426.

— du verbascum, pl. 88, fig. 2, p. 426. Calope serraticorne, pl. 89, fig. 2, p. 416. I, 373. Cantharide vésicante, pl. 79, fig. 1, p. 419. I, 393. Capricorne quadrimaculé, pl. 84, fig. 2, p. 426. II, 26.

- rosalie, pl. 84, fig. 1, p. 426.

- sutural, pl. 85, p. 426.

Carabe americain, pl. 75, fig. 5, p. 385. I, 161.

- bimaculé, pl. 76, fig. 1, p. 385. - ceint, pl. 76, fig. 2, p. 385.

Casside grosse, pl. 97, fig. 4, p. 428. II, 45. — maculée, pl. 97, fig. 3, p. 428.

- treillie, pl. 97, fig. 5, p. 428. - verte, pl. 97, fig. 2, p. 428.

Cébrion longicorne, pl. 73, fig. 5, p. 392. I, 257. Cérocome de Schoeffer, pl. 79, fig. 4, p. 419. I, 390. Cétoine marginée, pl. 68, fig. 4, p. 409. I, 338. Chalcis clavipède, pl. 53, fig. 6, p. 461. II, 228. Charencon impérial, pl. 91, fig. 5, p. 422. I, 405.

- des noisettes, pl. 91, fig. 4, p. 422.

Charencon palmiste, pl. 91, fig. 1, p. 422. - paraplectique, pl. 91, fig. 2, p. 422. - de Rhor, pl. 91, fig. 6, p. 422. - du sapin, pl. 91, fig. 3, p. 422. Chevaliers, p. 480. Chrysomèle bordée, pl. 94, fig. 2, p. 429. II, 55. - å collier, pl. 94, fig. 1, p. 429. - pustulée, pl. 93, fig. 5, p. 429. - rayée, pl. 94, p. 429. Cigale armée, pl. 58, fig. 5, p. 441. II, 151. Cinyps des chrysalides, pl. 53, fig. 5, p. 441. II, 226. Cimbex fémoral, pl. 49, fig. 2, p. 456. II, 202. Cimbex jaune, pl. 50, fig. 1; (sa larve), fig. 2; (sa coque), fig. 3; (anneaux de sa larve), fig. 4, p. 456. II, 202. - du saule, pl. 51, fig. 1 et 2; (larve), fig. 3; (coque), fig. 4; (nymphe), fig. 5; (dépouille de la larve), fig. 6; (œufs), fig. 7, p. 456. Cicindèle carolinoise, pl. 75, fig. 3, p. 381 I, 94. Cistèle céramboïde, pl. 80, fig. 4, p. 416. I, 371.

- sulfureuse, pl. 80, fig. 5, p. 416. Clairon ichneumonaire, pl. 90, fig. 2, p. 399. I, 282. - mutillaire, pl. 89, fig. 5, p. 399 et 400.

Cloporte aselle, pl. 109, fig. 3, p. 349. - océanique, pl. 109, fig. 4, p. 349.

Clytre bucéphale, pl. 96, fig. 6, p. 428. II, 49.

- longimane, pl. 96, fig. 4, p. 428. - longipède, pl. 96, fig. 5, p. 428. - rougeatre, pl. 97, fig. 1, p. 428.

Coccinelle échiquier, pl. 98, fig. 4, p. 431. II, 70.

- imponetuée, pl. 98, fig. 2, p. 431.

- oculée, pl. 98, fig. 3, p. 431. Cochenille de l'oranger, pl. 60, fig. 1, p. 444.

II, 170. Colidie allongée, pl. 92, fig. 4, p. 424. II, 14. Corise striée, pl. 60, fig. 1, p. 441. II, 147. Cousin commun, pl. 105, fig. 2, p. 489. II, 357. Criocère anguleux, pl. 95, fig. 1, p. 427. II, 41.

- bimaculé, pl. 95, fig. 1, p. 427. Criquet biponctué, pl. 65, fig. 4, p. 436. II, 104.

- morbilleux, pl. 65, fig. 3, p. 436.

Criocere bossu, pl. 82, fig. 4, p. 474. II, 41. Cucujo clavipėde, pl. 92, fig. 5, p. 424. II, 15. Cynodendron cylindrique, pl. 67, fig. 3, p. 408.

D.

Dermeste du lard, pl. 69, fig. 3, p. 399, 402. I, 296. Diapère du bolet, pl. 80, fig. 6, p. 414. I, 361. Diplolèpe, pl. 53, fig. 4, p. 455 et 441. II, 403. — du rosier, pl. 52, fig. 5, p. 455 et 470. Donacie rayée, pl. 88, fig. 5, p. 427. II, 39. Drile jaunatre, pl. 72, fig. 4, p. 396. I, 269. Dryops auricule, pl. 78, fig. 2, p. 400 et 404. Dytique marginal (male), pl. 77, fig. 2; (femelle), fig. 3, p. 405. I, 188.

E.

Elaphre aquatique, pl. 75, fig. 4, p. 386. I, 183. Elophore aquatique, pl. 76, fig. 5, p. 406. I, 308. Ephémère commune, pl. 44, fig. 5; (tête isolée), fig. 6, p. 446. II, 179.

Erotyle géant, pl. 92, fig. 6, p. 430. II, 67. - surinamois, pl. 93, fig. 1, p. 430.

Escarbot réniforme, pl. 69, fig. 2, p. 399 et 400. I, 283.

Eucère à longues antennes, pl. 57, fig. 3, p. 476. II, 284.

Eudomique écarlate, pl. 94, fig. 3, p. 429. Evanie appendigastre, pl. 48, fig. 2. II, 217.

F.

Faucheur des murailles, pl. 109, fig. 2, p. 364. Forficule biponctuée, pl. 98, fig. 5, p. 434. II, 91. Fourmi fauve, pl. 45, fig. 2; (coque), fig. 3, p. 465. II, 338.

- Hercule, pl. 45, fig. 1, p. 465. Frelon criblé, pl. 46, fig. 2, p. 465.

Frigane grande, pl. 44, fig. 1; (larve), fig. 2, p. 453. II, 196.

Frigane rhombifere, pl. 44, fig. 3; (fourreau), fig. 4, p. 453.

— striee, pl. 43, fig. 4; (larve), fig. 5, p. 453. Fulgore porte-chandelle, pl. 58, fig. 1, p. 442. II, 153.

porte-lanterne, pl. 57, fig. 5, p. 442.
phalénoïde, pl. 58, fig. 2, p. 442.

G.

Galéruque rustique, pl. 94, fig. 6, p. 430. II, 61.

— violette, pl. 94, fig. 7, p. 430.

Galles de chêne, pl. 53, fig. 1 et 2; (larve), fig. 3, p. 441. II, 169.

Gribouri azuré, pl. 95, fig. 5, p. 428. II, 51.

— bleuet, pl. 95, fig. 6, p. 428.

— cordifère, pl. 96, fig. 1, p. 428.

— de la vigne, pl. 96, fig. 3, p. 428.

— à taches, pl. 96, fig. 2, p. 428.

Grillon champetre, pl. 63, fig. 4; (male et femelle), p. 435. II, 99.

- taupe, pl. 63, fig. 1; (pate antérieure), fig. 2; (nid), fig. 3, p. 435.

Guêpe commune, pl. 46, fig. 5, p. 471. II, 264.

— frelon, pl. 46, fig. 1; (mâle), fig. 2; (femelle), p. 471. II, 264.

Guêpier de la Guêpe cartonnière, pl. 47, fig. 1, p. 471. II, 264.

Gyrin nageur, pl. 78, fig. 1, p. 387 et 388. I, 197.

H.

Hanneton foulon, pl. 68, fig. 3, p. 409. I, 330. Hélops lanipède, pl. 81, fig. 4, p. 416. I, 369. Hémérobe aquatique, pl. 41, fig. 2; (larve), fig. 3; (nymphe), fig. 4, p. 462. II, 187. Hémérobe chrysops, pl. 42, fig. 1, p. 462. II, 187. — perle, pl. 41, fig. 5, p. 462. Hépiale louvette, pl. 25, fig. 5, p. 482 II, 326. Hépohosque du cheval, pl. 106, fig. 1, p. 499. II, 404.

Hippobosque de l'hirondelle, pl. 106, fig. 2, p. 499. Hispe âtre, pl. 95, fig. 5, p. 428. II, 45. — testacée, pl. 95, fig. 3, p. 428. Horie maculée, pl. 80, fig. 3, p. 418. I, 387. Hydrophile brun, pl. 77, fig. 1, p. 405. I, 305. Hypophlée marron, pl. 71, fig. 6, p. 414. I, 360.

I.

Ichneumon attrayant, pl. 48, fig. 3, p. 459. II, 218. — jaunâtre, pl. 48, fig. 4, p. 459. — pelotonné, pl. 48, fig. 5, p. 459. Ips à antennes noires, pl. 71, fig. 3, p. 397. I, 295.

J.

Jule terrestre, pl. 110, fig. 1, p. 366. I, 67.

K.

Kermès femelle du petit chêne, pl. 59, fig. 6, p. 444. II, 171.

L.

Lagrie velue, pl. 79, fig. 5, p. 416. I, 373.

Lamie tornator, pl. 87, fig. 3, p. 426. II, 20.

— trifasciée, pl. 86, fig. 1, p. 426.

— triste, pl. 86, fig. 2, p. 426

Lampyre marginé, pl. 73, fig. 2, p. 395. I, 261.

Lépismène du sucre, pl. 106, fig. 5, p. 375. I, 73.

Lepture hastée, pl. 88, fig. 2, p. 426. II, 33.

— interrogation, pl. 88, fig. 4, p. 426.

— quadrimaculée, pl. 88, fig. 3, p. 426.

Lethrus céphalote, pl. 66, fig. 3, p. 407. I, 324.

Libellule Amélie, pl. 40, fig. 1; (mâle), fig. 2; (femelle), p. 446. II, 174.

— bronzée, pl. 39, fig. 2, p. 446.

— grande, pl. 39, fig. 3, p. 446.

— vierge, pl. 39, fig. 3, p. 446.

Lucane cerf-volant, pl. 66, fig. 1; (mâle et femelle), fig. 2, p. 410. I, 342.

Lupère flavipède, pl. 89, fig. 3, p. 429. II, 61.

Lyctes canaliculé, pl. 71, fig. 4, p. 424. II, 13. Lycus réticulé, pl. 73, fig. 3, p. 395. I, 260. Lymexylon naval, pl. 72, fig. 6, p. 392 et 398. I, 274.

M.

Macrocéphale albinos, pl. 92, fig. 3, p. 476. I, 101. Malachie bronzé, pl. 73, fig. 1, p. 396. I, 267. Mante oratorienne, pl. 65, fig. 1, p. 434. II, 94. Manticore maxillaire, pl. 76, fig. 4, p. 380. I, 94. Mélasis buprestoïde, pl. 73, fig. 4, p. 393. I, 248. Meloé de mai, pl. 78, fig. 6, p. 419. I, 391. Mélyre vert, pl. 72, fig. 2, p. 396. I, 265. Membracis oreillarde, pl. 58, fig. 4, p. 442. II, 163.

— cornue, pl. 58, fig. 3, p. 442.

Micétophage quadrimaculé, pl. 71, fig. 5, p. 424.

Mitte reduve, pl. 107, fig. 6, p. 363.

Molorque raccourci, pl. 89, fig. 1, p. 426. II, 31.

Mordelle 8-points, pl. 82, fig. 5. I, 383.

Mutille européen, pl. 46, fig. 1, p. 466. II, 242.

Mylabre trifascié, pl. 79, fig. 2, p. 419. I, 388.

Myrmiléon ascalaphe barbare, pl. 43, fig. 2, p. 465.

II, 184.

- des fourmis, pl. 42, fig. 2; (larve), fig. 3; (coque), fig. 4; (peau de la nymphe), fig. 5; (tête de la larve), fig. 6, p. 465. II, 184.

- libelluloïde, pl. 43, fig. 1, p. 465. II, 184.

N.

Necydale fauve, pl. 88, fig. 6, p. 426. II, 32.

Némotèle hottentote, pl. 100, fig. 1, p. 494. II, 380.

Nèpe cendrée, pl. 60, fig. 6, p. 440. II, 145.

— linéaire, pl. 60, fig. 5, p. 440.

Nèpe cimicoïde, pl. 61, fig. 1, p. 440. II, 145.

Nécrophore fossoyeur, pl. 69, fig. 5; (larve), fig. 6, p. 401. I, 286.

Nitidule bordée, pl. 70, fig. 2, p. 402. I, 289.

Notoxe unicorne, pl. 79, fig. 7, p. 418.

Noctuelle ansée, pl. 29, fig. 1, p. 484. I, 386.

Noctuelle batis, pl. 26, fig. 1; (chenille), fig. 2; (chrysalide), fig. 3, p. 484. II, 341.

- du bouillon blanc, pl. 30; (chenille), fig. 2; (coque), fig. 3; (chrysalide), fig. 4, p. 484. II, 341.

- du chêne, pl. 27, fig. 1; (chrysalide), fig. 3; (chenille), fig. 2, p. 484. II, 341.

— découpée, pl. 28, fig. 1; (chenille), fig. 2; (chrysalide), fig. 3, p. 484. II, 341.

- de la festuque, pl. 29, fig. 4, p. 484. II, 341. - du frêne, pl. 26, fig. 4, p. 484. II, 341.

- hiéroglyphique, pl. 25, fig. 1, p. 484. II, 341.

- pâle, pl. 25, fig. 2, p. 484. II, 341.

- à quatre points (mâle), pl. 25, fig. 1; (femelle), fig. 2, p. 484. II, 341.
— sulfurée, pl. 29, fig. 2, p. 484. II, 341.

- vert-doré, pl. 29, fig. 3, p. 484. II, 341.

Nomade à antennes rousses, pl. 57, fig. 4, p. 474. II, 278.

Notonecte glauque, pl. 60, fig. 3, p. 441. II, 147.

OEstre des veaux, pl. 99, fig. 1, p. 497. II, 392. Omalie suturale, pl. 72, fig. 5, p. 395. 1, 223. Opatre gris, pl. 81, fig. 1, p. 413. I, 354. Oxipore maxillaire, pl. 78, fig. 4, p. 389. I, 201.

P.

Panorpe commune, pl. 43, fig. 3, p. 451. II, 184. Papillon Apollon, pl. 6, fig. 3, p. 480. II, 307.

— Apollon (sa chenille), pl. 6, fig. 4, p. 480.

II, 307. - aurore, mâle, pl. 7, fig. 1, p. 480. II, 307.

- de la cassave, pl. 9, fig. 2, p. 480. II, 307.

— de la casse, pl. 7, fig. 3, p. 480. II, 307. — Cupidon, pl. 11, fig. 1 et 1, p. 480. II, 307.

— deuil, pl. 10, fig. 2, p. 480. II, 307. — deuil (sa chenille), pl. 10, fig. 2, p. 480.

II, 307. - aurore, femelle, pl. 7, fig. 1, p. 480. II, 307.

```
26
              TABLE ALPHABÉTIQUE
Papillon du fenouil, pl. 6, fig. 1, p. 480. II, 307.
- hypsile, pl. 10, fig. 1, p. 480. II, 307.
- leitus, pl. 5, fig. 2, p. 480. II, 307.
- Mars, pl. 8, fig. 2, p. 480. II, 307.
- miroir, pl. 12, fig. 2, p. 480. II, 307.
- morio, pl. 9, fig. 3, p. 480. II, 307.
- paon de jour, pl. 9, fig. 1, p. 480. II, 307.
- petit nacré, pl. 10, fig. 3, p. 480. II, 307.
- porte-queue bleu strié, pl. 12, fig. 1, p. 480.
  II, 307.
- Priam, pl. 5, fig. 1, p. 480. II, 307.
- du ricin, pl. 6, fig. 2, p. 480. II, 307.
- souci, pl. 7, fig. 2, p. 480. II, 307.
- tristan, pl. 8, fig. 1, p. 480. II, 307.
- vergeté, pl. 11, fig. 2, p. 480. II, 307.
Passale interrompu, pl. 66, fig. 2, p. 410. I, 344.
Pédère riverain, pl. 78, fig. 5, p. 390. I, 218.
Pentatome des buissons, pl. 61, fig. 7, p. 437.
  II, 116.
- de Fabricius, pl. 61, fig. 6, p. 437. II, 116.
- des légumes, pl. 62, fig. 1, p. 437. II, 116.
- à lignes noires, pl. 61, fig. 7, p. 437. II, 116.
- orné, pl. 62, fig. 2, p. 437. II, 116.
Perle brune, pl. 40, fig. 3, p. 453. II, 198.
Phalène à bandes à l'envers, pl. 32, fig. 6, p. 483.
  II, 337.
- en faucille, pl. 31, fig. 2, p. 483. II, 337.
- jaspée, pl. 31, fig. 4, p. 483. II, 337.
- mouchetée, pl. 32, fig. 5, p. 483. II, 337.
- printanière, pl. 31, fig. 1, p. 483. II, 337.
- soufrée, pl. 31, fig. 3, p. 483. II, 337.
- de la stratiote, pl. 32, fig. 4, p. 483. II, 337.
- verte, pl. 32, fig. 1; (sa chenille), fig. 2; (chry-
  salide), fig. 3, p. 483. II, 337.
Pimélie striée, pl. 81, fig. 416. I, 348.
Pince cancroïde, pl. 107, fig. 7, p. 363.
Podure verte, pl. 107, fig. 1, p. 376. I, 75.
```

Pou de la cigogne, pl. 107, fig. 4, p. 377. I, 79.

— humain, pl. 107, fig. 2, p. 377. I, 79.

— du pubis, pl. 107, fig. 3, p. 377. I, 79.

Prione cervicorne, pl. 83, p. 425. II, 19.

Psyle du figuier, pl. 59, fig. 3, p. 443. II, 165. Ptérophore en éventail, pl. 38, fig. 3, p. 486. II, 352.

- pentadactyle, pl. 38, fig. 4, p. 486.

teneredactyle, pl. 38, fig. 5, p. 486.
Puce irritante, pl. 106, fig. 3; (larve), fig. 4, p. 377. I, 85.

Ptine impérial, pl. 71, fig. 1, p. 397. I, 270.

— pectinicorne, pl. 71, fig. 2, p. 397.

Puceron de l'orme, pl. 59, fig. 4, p. 443. II, 167.

Punaise aptère, pl. 61, fig. 4, p. 438. II, 138.

— feuille épineuse, pl. 61, fig. 2, p. 438.

porte-croix, pl. 61, fig. 3, p. 438.
rongée, pl. 61, fig. 2, p. 438.

Pyrale verte à bandes, pl. 33, fig. 1; (chenille), fig. 2; (coque), fig. 3, p. 484. II, 346.

- verte des pommes, pl. 33, fig. 4; (chenille), fig. 5; (chrysalide), fig. 6, p. 484.

Pyrochre cardinale, pl. 80, fig. 2, p. 417. I, 381

R

Raphidie aphiopse, pl. 41, fig. 1, p. 453. II, 192. Reduve à masque, pl. 62, fig. 3, p. 439. II, 139. Rhinomacer charençon, pl. 92, fig. 2, p. 417. I, 377. Ripiphore flabelle, pl. 82, fig. 6. I, 382.

S.

Saperde bicolore, pl. 87, fig. 2, p. 426. II, 23.

ponctué, pl. 84, fig. 3, p. 426.

Sauterelle rouge à verrues, pl. 64, fig. 1; (mâle et femelle), fig. 2; (larve), fig. 3; (œufs), fig. 4, p. 435. II, 100.

Scarabée bourreau (mâle et femelle), fig. 4 et 5,

p. 408. I, 328.

- fimetaire, pl. 67, fig. 3, p. 408. - Hercule, pl. 67, fig. 2, p. 408.

— sacré, pl. 68, fig. 1, p. 408. Scaphidie quadrimaculé, pl. 72, fig. 1, p. 422. I, 295. 28 TABLE ALPHABÉTIQUE Scarite géant, pl. 76, fig. 3, p. 383. I, 124. Scaure strié, pl. 82, fig. 3, p. 412. I, 348. Scolie des jardins, pl. 54, fig. 5, p. 467. II, 247. - à 4 taches, pl. 54, fig. 4, p. 467. Scolopendre mordante, pl. 110, fig. 2, p. 375. I, 72. Scolyte bostriche, pl. 90, fig. 3, p. 324. II, 3. Scorpion d'Europe, pl. 109, fig. 1, p. 362. Sépidie réticulée, pl. 82, fig. 2, p. 412. I, 349. Serropalpe caraboïde, pl. 81, fig. 3, p. 415. I, 368. Sésie apiforme, pl. 16, fig. 1, p. 482. II, 319. - de la filipendule, pl. 16, fig. 2; (sa chenille), fig. 3; (sa coque), fig. 4, p. 482. - moro-sphinx, pl. 15, fig. 1; (sa chenille), fig. 2, p. 482. - turquoise, pl. 16, fig. 5, p. 482. Sinodendron cylindrique, pl. 67, fig. 1, p. 408. I. 340. Sphéridie scaraboïde, pl. 70, fig. 5, p. 405 et 406. I, 30g. Sphinx tête-de-mort, pl. 13, fig. 1; (sa chenille), fig. 2, p. 481. II, 316. - du troëne, pl. 13, fig. 2, p. 481. — de la vigne, pl. 4, fig. 1; (sa chenille), fig. 2; (chrysalide), fig. 3, p. 481. - de la vigne (sa chenille), pl. 15. Sphex azuré, pl. 54, fig. 2, p. 468. II, 251. - porte-épine, pl. 54, fig. 3, p. 468. - du sable, pl. 54, fig. 1, p. 468.

Spondyle buprestoide, pl. 89, fig. 4, p. 425.

II, 19. Staphylin bourdon, pl. 78, fig. 3, p. 389. I, 202. Stencore azuré, pl. 87, fig. 3, p. 426. Stratiome caméléon, pl. 100, fig. 2; (sa larve),

fig. 3, p. 494. II, 378. - clavipède, pl. 100, fig. 5, p. 494. - triliné, pl. 100, fig. 4, p. 494.

T:

Taon albipède, pl. 99, fig. 2, p. 492. II, 373.

- noir, pl. 99, fig. 4, p. 492.

- ruficorne, pl. 99, fig. 3, p. 492. Taupin tricolore, pl. 73, fig. 6, p. 392. I, 249.

- phosphorique, pl. 74, fig. 1, p. 392.

Teigne de la cire, pl. 34, fig. 1; (chenille), fig. 2; (coque), fig. 3; (chrysalide, fig. 4, p. 485. II, 349.

- fripière, pl. 35, fig. 1; (chenille), fig. 2; (chry-

salide), fig. 3, p. 485.

— du fusain, pl. 36, fig. 1; (coques), fig. 2, p. 485. - des pelleteries, pl. 35, fig. 4; (chenille), fig. 5; (fourreau), fig. 6; (chrysalide), fig. 7, p. 485. Teigne des tapisseries, pl. 36; (chenille), fig. 4; (fourreau), fig. 5; (chrysalide), fig. 6, p. 485. II, 349.

Ténébrion culinaire, pl. 81, fig. 3, p. 414. I, 356. Tenthredo sans nœuds, pl. 52, fig. 1, p. 456.

II, 202.

- du pin, pl. 52, fig. 2, p. 456.

- septentrional, pl. 52, fig. 3, p. 456. - à tête jaune, pl. 52, fig. 4, p. 456.

Terme fatal, pl. 45, fig. 4; (nymphe), fig. 5, p. 453.

II, 192. Tétratome des bolets, pl. 69, fig. 4, p. 415. I, 365. Tettigonie à écume, pl. 59, fig. 2, p. 442. II, 158.

— à taches rouges, pl. 59, fig. 1, p. 442. Tipule pectinicorne, pl. 105, fig. 3, p. 489. II, 360.

Trichie delta, pl. 68, fig. 5, p. 408. I, 337. Thrips de l'orme, pl. 59, fig. 5, p. 443. II, 167.

Tille serraticorne, pl. 72, fig. 3, p. 400. I, 281. Tritome bipustulé, pl. 98, fig. 1, p. 430. II, 68.

Trogosite verdâtre, pl. 71, fig. 7, p. 424. II, 12.

Trombidion des teinturiers, pl. 107, fig. 5, p. 365. Trox sabuleux, pl. 68, fig. 2, p. 408. Truxale à grand nez, pl. 65, fig. 2, p. 436. II, 103. Typhie à grosses cuisses, pl. 48, fig. 1, p. 303 et

347.

30 TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES.

·U.


Urocère géant, pl. 49, fig. 1, p. 456. II, 214.

Vrillette marquetée; pl. 70, fig. 5, p. 397. I, 272.
Z.

Zonite piézate, pl. 79, fig. 3, p. 419. I, 394.

FIN DE LA TABLE DES PLANCHES.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET, rue de Vaugirard, n° 9.




Deseve del.

P. Tardieu Sculp.

Anatomie des insectes.






Deseve del. 12 Tardieu Sculp.

Anatomie des insectes.






Anatomie des insectes.

Ve Tardieu Sculp.






Deseve del.

Ve Tardieu Sculp.

Anatomie des insectes.






1. Priam.

2. Leytus.






- 1. Du Fenouil.
- 2. Du Ricin.

- 3. Apollon.
 - 4.Sa Chenille.






1. Aurore M.

1. Aurore F.

- 2. Souci.
- 3. De la Casse.






1. Tristan.

2. Mars.






1. Le Paon du jour.

- 2. De la Cassave.
- 3. Morio .






- 1. Hypsile .
- 2. Denil.

- 2 . Sa Chemille .
- .5. Petit Nacre.






1. Cupidon.


2. Vergeté .





1.1. Porte-queue . 2.2. Miroir . bleu Strie .






1. Tête de Mort.

2. Sa Chenille.

3. Du Troëne .






1. De la Vigne. 2. Sa Chenille.

3. Sa Chrysalide.






1. Moro-Sphinx.

1. Sa Chenille .

2. Chenille. Tête de mort.





1. Apiforme.


2. De la Filipendule.

3. Sa Chenille.

4 . Sa Coque.


5 Turquoise.





Bom . atlas .






1. Bom. grand Paon. 2. Sa Chenille .

- 3. Sa Coque. 4. Sa Chrysalide.






1. Bom. du Chêne.

- 2.Sa Chenille .
- 3. Bom queue fourchue. 4. Sa Chemille.






1. Processionnaire.

2. Chrysorrhee.

3. Sa Chenille.






1. Bom. a Soie. 2.Sa Chenille

3.Sa Coque.

4. Sa Chrysalide. 5. Ses Œufs.






1. Cossus.

- 2 Sa Chenille .
- 3 · Sa Coque · 4 · Sa Chrysalide ·






. 1. Disparate M.

- 2. Disparate F.
- 3 . Œufs .
- 4 . Sa Chenille .






- 1. Carmin.
- 2. Sa Chenille .
- 3. Etoile M.

- 4. Etoile F.
- 5. Sa Chenille.
- 6. Sa Coque.






Deseve del.

- 1. Hieroglyphique
 - 2 Pale
 - 5. Hépiale Louvette.

Letellier Sculp .


- 3. Points Male
- 4 . Points F.1e






- 1. Batis .
- 3. Sa Chrysalide
- 2. Sa Chenille. 4. Du Frêne.





Du Chêne .
 Sa Chenille .
 Sa Chrysalide .






1. Découpée. 2. Sa Chenille.

3. Sa Chrysalide.






1. Ansee.

- 2. Sulfurée .
- 5.5. Vert-doré.
- 4. De la Festuque.






2. Du Bouillon blanc. -

- 2. Sa Chenille.
- 3. Sa Coque. 4. Sa Chrysalide.






- 1. Printanière.
- 2 En Fancille.


- 3. Sonfrée.
- 4. Jaspée.





- 1. Verte.
- 2. Sa Chemille.
- 3 Sa Chrysalide. 6. a Bande a l'envers-
- 4. Du Stratiote .
- 5. Mouchetée.





1. Verte a bande. 4. Des Pommes.


2. Sa Chenille.

5. Sa Chenille.

3.Sa Coque.


6. Sa Chrysalide.





De la Cire.3b. Sa Coque.2a. Sa Chemille.4 c. Sa Chrysahde.





1...Fripiere

5 a. Sa Chemille.

2 a. Sa Chenille.

6b. Son Foureau.

3 b. Sa Chrysalide.

7c. Sa Chrysalide.


4...Des Pelleteries.

A Section 15

....

ATT OF A T

.11



1. Du Fusain.

4 a Sa Chenille


2. Coques.

5b. Son Foureau.

3. Des Tapisseries.

6 c. Sa Chrysalide.






1...Al des grains. 2 a Sa Chenille.

3b. Paquets de grains.

4. Sa Chrysalide. 5. Al. de Degeer.






1. Al. de Réaumur

- 2.Al. D'Erxleben.
- 3.Pt. en Eventail.
- 4. Pt. Pentadactyle .
- 5. Pt. Tesseredactyle.






1. Lib. bronzee.

2. Lib. grande.

3. Lib. Vierge.






1. Lib. Amelie M.

2 · Amelie F.

3. Per brune.






- 1. Raf. Ophiopse 2. Hém. aquatique 3. Sa Larve

- 4. Sa Nymphe. 5. Hem. perle.






1. Hém. Chrysops. 2. Myrm. des fourmis.

3. Sa Larve.

4. Sa Coque. 5. Peau de la Nymphe. 6. Tête de la Larve.






1. Myrm . libelluloide .

- 2 . Asc . barbare.
- 3. Panop. commune.

- 4. Frig. strice. 5. Sa Larve.






- 1. Frig: grande. 2.Sa Larve.
- - 3. Frig rhombifère.

- 4. Son Fourreau.
 5. Ephe. commune
 6. Tete dEphemore.






1. F. Hercule.

2.2. F. Fauve.

3. . Sa Coque

4. T. Fatal.
5. Sa Nymphe.





1. M. Européen. 2. F. Crible.

5. G. Frelon M.

4. G. Frelon F.

5. G. Commune.






1)1. Guépier de la Guépe Cartonnière

- 2. L. Dorsigere
- 3. Chrysis enflammé:






1.T. a grosses-cuisses 2.E. Appendigastre 3...Vich. attravant


- 4. l'Ich. jaunâtre. 3. l'Ich. pelotonné.






1. l'Urocère géant. 2 et 3. Cim fémoral.






1. C. jaune. 5. Sa Coque. 2 Sa Larve. 4. Auneaux de la Larve.





1 et 2 · C · du Saule · 5 · Sa Nymphe · 3 · · · · Sa Larve · 6 · Dépouille de la Larve · 4 · 4 · Sa Coque · 7 · Œufs ·






1. T. sans Nœud.

2.T. du Pin.

3.T. Septentrional.


4 T. à tête janne. 5 . Dipl. du Rosier.





- 1 et 2. Galles du Chène
- 5 . . . Larve .
- 4 . . . Diplolèpe
- 5. Cyn des Chrysalides.
- 6. Chal. Clavipede.





1. Sph. du Sable.


2. Sph. azuré

3. Sph. porte-épine.

4. Sc. à quatre taches.


5.Sc. des jardins.





- 1. B. de la Caroline.
- 2. B. Pubescent.
- 3. And. dn. Coquelicot.
- 4. And. verte.
- 5. And. verdâtre.





Baraband del Ruche en Livre . Letellier Sculp





1. Ab . terrestre


2. Ab. a Miel. F.

3. Euc. à longues antennes.

4. Nom. a antennes

5. Ful. porte-lanterne.






1. F. Porte - Chandelle.

- 2.F Phalenoide
- 3.M. Cornue

- 4.M. Aureillarde
- 5. C. Ornée.





1. Tet. à taches rouges 2. Tet. à écume.


3. Ps. du Figuier

4.4. Puc. de l'Orme.

5. Thr. de l'Orme.


6 . Ker.F. du petit Chène.

કે જ ફ્રુપ્યાન કેલ ફ્રુપ્ય તેલું કરો છે. દે, તેલું કરો અને કે હોઈ જે જ જીવા કોઈ સ્ટી છે.



- 1 1. Coc F. de l'Oranger. 2.2.Al. de l'Eclaire
- 3.. Not. Glauque.
- 4. Cor. Strice.
- 5. Nep. Lineaire.
- 6. Nep. Cendrée.






- 1 N. Cimicoide .
- 2 · Pu · feuille épineuse · 3 · Pu · rongée · 4 · Pu · porte croix ·

- . 5.Pn. aptere .
 - 6. Pent de fabricius.
 - 7. Pent. a lignes noires. 8. Pent. des Buissons.






1. Pent. des légumes 2. Pent. ornée.


- 3. Red. à Masque.
- 4. Blat. de Madère . 5. Blat. Kakkerlac .





- 1 Le Grillon Taupe. 2. Une de ses Pattes. antérieures.
- 3. Son Nid.
- 4. Gril. Champètre M 5. Gril. Champètre F.





1. S. Rouge-Verrue M. 2 S. Rouge Verrue F.

3. Larve .

4. Enfs.






1. Mante oratorienne. 3. Criquet Morbilleux.

2. Truxale à grand Nez. 4. Criquet biponctue.


Pl.66.



1. Lucane cerf volant M. 3. Passale interrompu.

2. Lucane cerf volant F. 4. Letrus Cephalote.






1. Cyno dendron Cylindrique. 4. Scarabe boureau M.

2. Scarabe hercule . 5. Scarabe boureau F.

3. Scarabe fimetaire.






1. Scarabé sacré. 4. Cetoine marginée. 2. Trox Sabuleux. 5. Trichie delta.

3. Hanneton foulon.






- 1. L'H. réticulé.
- 2. L'Esc. réniforme.
- 3.Derm. du Lard.

- 4. Tet. des Bolets.
- 5. Nec . fossoveur .
- 6. Sa Larve.






- 1. Bouc . thoracique .
- 2. Nit. bordée .
- 5. Byr. pilule.


- 4 . Ant. destructeur .
- 5. Sphe . scaraboide .
- 6. Vril. marquetee





- 1. Pti . Imperial :
- 2 Ptil pectinicorne .
- 3. Ips. a autennes noires
- 4. Lyc. Canalicule .
- 5. Mi. quadrimaculé. 6. Hyp. marron. 7. Trog. verdatre.






- 1. Scap. quadrimaculé. 2.Mél vert.
- 3. Til. Serraticorne.
- 4. Dril. jaunâtre.

- 5. Omal Sutural.
- 6. Ly. Naval.
- 7. Téléph. bimaculé.






- 1. Mal. bronzé
- 2. Lam. margine
- 5. Ly. reticule .
- 4. Mél. Baprestoïde. 5. Ceb. longicorne 6. Taupin tricolor.






Pl.74.



1. Taup phosphorique. 2. Bup. bande - dorée.

3. Bup. Marron.






1. Bup . interrompu . 2. Bup . rubis . 3. Cic . Carolinois<mark>e</mark> .

Huber Sculp.

4. Eleph. aquatique. 5. Car. Americain.






1. Car. bimaculé. 2º Car. Ceint.

- 5. Scar. geant .

4: Mant. Maxiflaire.


5. Eloph. aquatique.



i. Hyd. brun. 2 Dyt. Marginal M.

3. Dyt. Marginal F.







1. Gyr . Nageur , 2. Dry . auricule . 3. Stap . bourdon .

4. Oxyp. Maxillaire 5. Ped. riverain

6. Mel. de Mai.






Baraband del.

- " Cauth vesicatoire.
- .. Myl. trifascie.
- 5. Zon piezate. 4 Cer. de Schaeffer.

V. Tardieu Sculp

- 5. Lag. velue.
- 6. Aæd. blene
- 7. Not. unicorne.





Baraband del.

1. Ap . bimaculé . 2. Pyr . Cardinal .

3. Hor . Maculée .


V. Tardieu Sculp.

4. Cist. Ceramboïde.

5. Cist. Sulphureuse.

6. Diap. du Bolet.






4. Helops lanipede.

1. Opatre gris
2. Ténébrion culinaire.

5. Pimelie strice

3. Serropalpe Caraboïde.






1. Blaps lisse. 2. Sepidie réticulée

- 3. Scaure Strie .
- 4. Crocice bossu.
- 5. Mordelle 8 points.
- 6. Ripiphore flabelle.




Pl.83.



Prione Cervicorne.





1. Capricorne rosalie

2 Capricorne quadrimaculé.

5. Saperde ponctué.




Pl,85.



Capricorne Sutural.







1 . Lamie trifasciée .

2 . Lamie triste .





- 1 Lamie tornator
- 2. Saperde bicolore.
- 5 Stencore azure
- 4. Callidie Stigmate. 5. Callidie usé.




1. Callidie du Verbascum. 4. Lepture interrogation.

2 Lepture hastée . 5 Donalie ravée .


3. Lepture quadrimaculée. 6. Necvdale fauve.






1. Molorque raccourci. 4. Spondyle buprestoïde 2. Calope Serraticorne. 5. Clairon Mutillaire. 5. Lupere flavipède.





- 1. Bostriche Capucin
- 2. Clairon ichneu monaire
- 3. Scolvte bostriche.
- 4 Bruche du pois.
- 5. Anthribe marbre.
- & Attelabe tête écorchée.
- 7. Attelabe vert.
- 8. Brachveere algerien.






1. Charanson palmiste.

- 2. Cha . paraplectique.
- 3. Cha. du Sapin.
- 4. Cha. des Noisettes.
- 5. Cha. imperial
- 6. Cha. de rhor.






1. Brente linéaire.

4. Colydie alonge. 2. Rhinomacer charançon. 5. Cucujo Clavipede

3. Macrocephale albinos

6. Erotyle geant.






Eroty, surmamois.
 Chrys, ravée.
 L'Alur, tricolor.
 Chrys, pustulée.

3. L'Alur grosse cuisse.






Baraband del.

Fe Tardieu Sculp.

- 1. Chrvs. à collier. 2. Chrys. bordee.
- 3. Endom écarlate.
- 4. Attise caroline .
- 5. Attise bicolore.
- 6. Galern rustique.
- Galern violette .

15 15 15

Jandane march de



Meunier del.

1. Crioce bimacale.

2. Crioce, anguleux. 3. Hisp. testacéc.


Te Tardieu Sculp.

4. Hisp. atre

S. Gribour azure.

6. Gribour bleuet.





Meunier del.


Te Tardieu Sculp.

1. Gribour. cordifere 4. Clvt. longimane.

2. Gribour. 8 taches 5. Clyt. longipede.


5. Gribour de la vigne. 6 Clyt buccphale.





- 1. Clytr. rougeatre.
- 2. Cass. verte.
- 3. Cass. maculee
- 4. Cass. grosse. 5. Cass. treillie.





1. Tritom bipustulée. 4. Cocci échiquier.


2. Cocci imponetuee 5. Forfic, biponetue.

3. Cocci oculee .






Pl.99.



1. Oest des veaux. 3. Taon ruficorne. 2. Taon albipède. 4. Taon noir.





1. Nemot. Hottentote.


4. Strat, triline.

2. Strat. Caméléon.

5. Strat. Clavipede.

3. Larve de Stratiome.






- 1. Syrph. vive.
- 2. Syrph. bourdon.
- 3. Syrph. pendant.
- 4 . Syrph . tenace .
- 3. Syrph . clavipede .
- 6. Syrph. crieur.








- Mouch meridienne
- Mouch geante.

 Mouch arrondie.
- 4. Mouch. solstitiale.
 - 5. Mouch. cuivrane.






1. Stomox siberite.

2 . Rhing à bec . 3 . Conops rufipède .

4. Mvop ferrugineux.
5. Rhag bécasse.
6. Asile frelon.






1. Asile doré.

2. Asile borde

3. Asile teuton.


4 . Emp . appendiculce . 5 . Bomb . bichon .





- 1 . Bombille ponetné
- 2 . Cousin commun .
- 3. Tipule pectinicorne.
- 4. Bibion précoce.
- 5 . Bibion noir M.
- 6. Bibion noir F.





1 Podure verte . 5. Trombidion des 2. Pou humain . teinturiers .

3 Pou du pubis. 6 Mitte reduve. 4 Pou de la Cigogne 7 Pince cancroïde.



Pl.108.




Araignéeporte croix.
 Autre portion de tête.
 Araignée aviculaire.
 Nid d'Araignée.
 Portion de tête de l'Araignée.






Pl. 109.



1. Scorpion d'Europe. 3. Cloporte aselle. 2. Faucheur des Murailles. 4. Clo. océanique.





1. Iule terrestre.

2 . Scolopendre Mordante .







